Genomeditech (Shanghai) Co., Ltd.
Order: +86 021-50432825/50432826
Email: service@genomeditech.com

产品手册

H_EGFR MC38 Cell Line

货号: GM-C39194

版本号：4.0.26.1020

规格参数

产品描述	H_EGFR MC38 Cell Line 采用慢病毒技术构建，为单克隆稳定细胞株，组成型表达人 EGFR 基因。
数量	5E6 Cells per vial,1 mL
产品形式	1 支冻存细胞
储运条件	干冰运输， -196° C 以下长期储存
靶点	H_EGFR
转录本	P00533-1
宿主细胞	MC38 Cell Line
复苏培养基	DMEM+10% FBS+1% P.S
生长培养基	DMEM+10% FBS+1% P.S+2.5 μg/mL Puromycin
培养备注	无
细胞冻存液	90% FBS+10% DMSO
生长特性	贴壁
培养条件	37°C, 5% CO_2
支原体检测	该细胞系已通过支原体检测，结果为阴性。
生物安全等级	Biosafety Level 2
备注	建议尽早扩增该细胞，并冻存至少 10 支，以便后续使用。


本公司产品仅供科研用途，严禁用于人体治疗！

实验材料与仪器

名称	Manufacturer/Catalogue No.
DMEM	Gibco/C11995500BT
Fetal Bovine Serum	ExCell/FSP500
Pen/Strep	Thermo/15140-122
Puromycin	Genomeditech/GM-040401
Anti-H_EGFR hIgG1 Antibody(Necitumumab)	Genomeditech/GM-49155AB
Countess 3 Automated Cell Counter	ThermoFisher/A49891
NovoCyte Flow Cytometer	Agilent/NovoCyte 2060R

验证结果

表达



	SampleID	Geometric Mean : R675-H
	MC38 anti-H_EGFR+APC-2nd Ab	1314
	MC38 H_EGFR H_IgG+APC-2nd Ab	1425
	MC38 H_EGFR anti-H_EGFR+APC-2nd Ab	238558

EGFR 流式表达验证。采用流式细胞术，用 Anti-H_EGFR hIgG1 Antibody(Necitumumab) (GM-49155AB）检测 H_EGFR MC38 细胞系（GM-C39194）的 EGFR 表达。

细胞复苏

复苏培养基：DMEM+10% FBS+1% P.S

为确保最高存活率，应在收到冻存细胞后立即解冻并复苏培养。如果在收到细胞后需要继续储存，将其置于液氮罐中，严禁储存在-70° C，因为在-70° C 下储存会导致活性丧失。

a) 37℃水浴锅预热复苏培养基，加入预热后的复苏培养基 5 mL 至 15 mL 离心管。

b) 从液氮中取出冻存细胞并迅速放入 37℃恒温水浴锅，将细胞液面浸至水面以下轻轻摇动解冻，直到刚刚融化（通常 2-3 分钟）。

c) 用 70%乙醇擦拭冻存管外部以降低污染的几率。在生物安全柜或超净台中将冻存管中的细胞悬液转移到步骤 a）的离心管中，轻轻混匀，176 × g，离心 3 min，使细胞沉淀，弃上清。

d) 使用 1 mL 复苏培养基重悬，可取出部分使用台盼蓝染色计数活细胞，活细胞≥ 3E6 cells/mL。

e) 通过补加复苏培养基的形式，调整活细胞密度到 2-3E5 cells/mL，根据细胞悬液总体积，将细胞接种到合适的培养皿中。

细胞冻存

细胞冻存液：90% FBS+10% DMSO

a) 使用 176 × g，3 min 离心收集细胞。

b) 使用预冷细胞冻存液（90% FBS + 10% DMSO）重悬细胞，细胞密度调整为 5E6 cells/mL，每管 1 mL 分装到细胞冻存管中。

c) 拧紧盖子，适当标记后，将冻存管置于梯度降温盒中，-80℃下保存至少 1 天，尽快转移至液氮中。

细胞传代

生长培养基： DMEM+10% FBS+1% P.S+2.5 μg/mL Puromycin

细胞复苏后的 1 至 2 代，使用复苏培养基，待细胞状态稳定后，再更换为含有抗生素的生长培养基。

a) 细胞为上皮细胞，贴壁生长。培养箱中孵育 16-24 h 后，镜下观察细胞贴壁情况，当细胞密度大于 60%，即可进行细胞传代。

b) 将皿或培养瓶中的培养液弃去，10 cm 皿加 2 mL PBS 润洗 1 次。

c) 弃 PBS，加 1 mL 0.25% Trypsin-EDTA 消化液，37° C 消化 30-60 s，显微镜下观察。

d) 待细胞变圆，细胞间隙明显，部分细胞刚开始脱离瓶壁时，加 2 mL 左右生长培养基混匀终止消化，将细胞小心吹打下来，176 × g 室温离心 3 min。

e) 弃上清，细胞沉淀用生长培养基重悬，根据传代前细胞密度分盘（根据培养皿面积和细胞密度计算，传代后细胞密度为 20-30%）。

细胞传代比例为 1:4-1:5，2-3 天传代。

培养备注

a) 细胞状态稳定后，传代后死细胞会变少，细胞生长速度趋于稳定，细胞形态均匀，胞体健壮。

序列

EGFR P00533-1

MRPSGTAGAALLALLAALCPASRALEEKKVCQGTSNKLTQLGTFEDHFLSLQRMFNNCEVVLGNLEITYVQRNY
DLSFLKTIQEVAGYVLIALNTVERIPLENLQIIRGNMYYENSYALAVLSNYDANKTGLKELPMRNLQEILHGAVRF
SNNPALCNVESIQWRDIVSSDFLSNMSMDFQNHLGSCQKCDPSCPNGSCWGAGEENCQKLTKIICAQQCSGRCR
GKSPSDCCHNQCAAGCTGPRESDCLVCRKFRDEATCKDTCPPLMLYNPTTYQMDVNPEGKYSFGATCVKKCPR
NYVVTDHGSCVRACGADSYEMEEDGVRKCKKCEGPCRKVCNGIGIGEFKDSLSINATNIKHFKNCTSISGDLHIL
PVAFRGDSFTHTPPLDPQELDILKTVKEITGFLLIQAWPENRTDLHAFENLEIIRGRTKQHGQFSLAVVSLNITSLGL
RSLKEISDGDVIISGNKNLCYANTINWKKLFGTSGQKTKIISNRGENSCKATGQVCHALCSPEGCWGPEPRDCVSC
RNVSRGRECVDKCNLLEGEPREFVENSECIQCHPECLPQAMNITCTGRGPDNCIQCAHYIDGPHCVKTCPAGVMG
ENNTLVWKYADAGHVCHLCHPNCTYGCTGPGLEGCPTNGPKIPSIATGMVGALLLLLVVALGIGLFMRRRHIVR
KRTLRRLLQERELVEPLTPSGEAPNQALLRILKETEFKKIKVLGSGAFGTVYKGLWIPEGEKVKIPVAIKELREATS
PKANKEILDEAYVMASVDNPHVCRLLGICLTSTVQLITQLMPFGCLLDYVREHKDNIGSQYLLNWCVQIAKGMN
YLEDRRLVHRDLAARNVLVKTPQHVKITDFGLAKLLGAEEKEYHAEGGKVPIKWMALESILHRIYTHQSDVWS
YGVTVWELMTFGSKPYDGIPASEISSILEKGERLPQPPICTIDVYMIMVKCWMIDADSRPKFRELIIEFSKMARDPQ
RYLVIQGDERMHLPSPTDSNFYRALMDEEDMDDVVDADEYLIPQQGFFSSPSTSRTPLLSSLSATSNNSTVACIDR
NGLQSCPIKEDSFLQRYSSDPTGALTEDSIDDTFLPVPEYINQSVPKRPAGSVQNPVYHNQPLNPAPSRDPHYQDP
HSTAVGNPEYLNTVQPTCVNSTFDSPAHWAQKGSHQISLDNPDYQQDFFPKEAKPNGIFKGSTAENAEYLRVAP
QSSEFIGA

相关产品

EGFR:HER2:HER3:HER4	
H_EGFR Reporter Cell Line	H_HER2 HER4 Reporter HEK-293 Cell Line
Cynomolgus_EGFR CHO-K1 Cell Line	Cynomolgus_ERBB3(HER3) CHO-K1 Cell Line
Cynomolgus_ERBB3(HER3) HEK-293 Cell Line	Cynomolgus_HER2(ERBB2) CHO-K1 Cell Line
H_EGFR CHO-K1 Cell Line	H_EGFR HEK-293 Cell Line
H_EGFRvIII CHO-K1 Cell Line	H_ERBB3(HER3) CHO-K1 Cell Line
H_ERBB3(HER3) HEK-293 Cell Line	H_ERBB3(HER3) MC38 Cell Line
H_HER2 EMT6 Cell Line	H_HER2 HER3 MC38 Cell Line
H_HER2 MCF-7 Cell Line	H_HER2(ERBB2) CHO-K1 Cell Line
H_HER2(ERBB2) CT26 Cell Line	H_HER2(ERBB2) LLC1 Cell Line
H_HER2(ERBB2) MC38 Cell Line	Mouse_HER3(ERBB3) CHO-K1 Cell Line
H_EGFR LGR5 CT26 Cell Line	H_EGFR LGR5 HEK-293 Cell Line
Anti-EGFR hIgG1 Reference Antibody (Cetbio)	Anti-EGFR hIgG1 Reference Antibody (Necbio)
Anti-ERBB3(HER3) hIgG1 Reference Antibody(Patribio)	Anti-H_EGFR hIgG1 Antibody(Necitumumab)
Anti-H_ERBB3(HER3) hIgG1 Antibody(Barecetamab)	Anti-H_HER2 hIgG1 Antibody(Margetuximab)
Anti-HER2 hIgG1 Reference Antibody(Marbio)	Anti-HER2 hIgG1 Reference Antibody(Trasbio)
Biotinylated Cynomolgus EGFR Protein; His-Avi Tag	Biotinylated Human EGFR Protein; His-Avi Tag
Biotinylated Human HER3 Protein; His-Avi Tag	Cynomolgus HER2 Protein; His Tag

Human EGFR Protein; hFc Tag	Human EGFR Protein; His Tag
Human HER2 Protein; hFc Tag	Human HER2 Protein; His Tag
Human HER3 Protein; hFc Tag	Human HER3 Protein; His Tag
Mouse HER3 Protein; His Tag	

使用许可协议

凡购买及使用本细胞系产品，即表明使用者自愿接受并遵守以下相关使用政策：

- 本细胞系产品限于科研用途，不得被利用于任何商业用途。
- 本产品严禁用于人类或动物疾病诊治，也不得直接用于人体相关实验。
- 用户及为其利益服务的第三方承包商仅可在约定科研范围内使用本材料及其子代，不得进行修饰，亦不得向任何其他实体（包括关联机构）分发、销售、转让或以其他方式提供吉满生物材料。
- 如需将本产品用于本声明范围以外的用途，须事先获得吉满生物科技（上海）有限公司的书面许可，详情请联系吉满生物科技（上海）有限公司。

Genomeditech